

Provtagning vid misstanke om kikhosta

Med anledning av hög smittspridning av kikhosta i samhället ger Smittskydd Halland här ett förtydligande av provtagningsrekommendationerna.

Syftet med tidig diagnostik av kikhosta är att skydda de nyfödda och yngsta spädbarnen mot allvarlig sjukdom.

Följande grupper bör därför prioriteras för provtagning tidigt i förloppet vid pågående luftvägssymtom (observera att det gäller oavsett vilken typ av luftvägssymtom som föreligger).

- Barn yngre än 6 månader
- Gravida i tredje trimestern (även de som vaccinerats mot kikhosta under graviditeten)
- Personer som har eller har haft kontakt med barn yngre än 6 månader och/eller gravida i tredje trimestern under smittsam period
- Personer som bor tillsammans med eller inte kan undvika kontakt med barn yngre än 6 månader eller gravida i tredje trimestern
- Vård och omsorgspersonal som i sitt arbete möter spädbarn eller gravida

Vid likartad sjukdomsbild hos flera hushållsmedlemmar prioriteras diagnostik av den som insjuknade senast.

Även vid **smittspårning** provtas kontakter med symtom om de tillhör någon av ovanstående grupper.

Nedan är exempel när provtagning **inte** är motiverad av smittskyddsskäl (men skulle kunna vara motiverat ur medicinsk synpunkt)

- Äldre barn, tonåringar och vuxna utan kontakt med barn yngre än 6 månader eller gravida i tredje trimestern.
- Personer med snuva eller hosta med motiveringen att de vill kunna umgås med spädbarn eller gravida utanför hushållet - här bör generellt avrådas från kontakt.
- Personer som hostat >3 veckor, utan kontakt under smittsam period med spädbarn under 6 månader eller gravida i tredje trimestern. Personen är inte längre smittsam och diagnostik/behandling gör inte skillnad för sjukdomsförlopp eller smittspårning.

Maria Ryberg Mo
Smittskyddsläkare Halland