

Akuta åtgärder vid incident med risk för blodsmitta



1. Skölj

Skölj med vatten och desinfektera!

Ögon – skölj med ögondusch, natriumklorid eller kranvatten

Hud eller slemhinna – skölj med vatten och desinfektera med t ex Klorhexidin eller handdesinfektion



2. Provtas

Använd pappersremiss! *

Person utsatt för blod = exponerad **

(Stickskada: *HBsAg, anti-HBs, anti-HCV och HIV*)

Person som blodet kommer ifrån om denne är känd = smittkälla ***

(Stickskada: *HBsAg, anti-HBs, anti-HCV och HIV*.
Vid känd hepatit C ta även *HCV-RNA*)



3. Vaccinera

Ge en dos vaccin mot hepatit B snarast och senast 48 timmar efter incidenten till personen utsatt för blod.

Följ upp med ytterligare doser, se [Terapirekommendationer Halland](#).

Vid känd blodsmitta hos smittkälla – ring Infektionsjouren!

Se rutin, länkar och mer info på [Vårdgivarwebben](#)



*Anges under Kliniska data i pappersremiss:

** Exponerad: när och var incidenten skett, smittkällans namn och personnummer.

*** Smittkälla: när och var incidenten skett, kontaktuppgifter och personnummer till exponerad.

Remitterande inrättning = företagshälsovården om sådan finns och om incidenten skett under arbetstid, annars provtagande enhet.