

# Akuta åtgärder vid incident med risk för blodsmitta



## 1. Skölj

### Skölj med vatten och desinfektera!

**Ögon** – skölj med ögondusch, natriumklorid eller kranvatten.

**Hud eller slemhinna** – skölj med vatten och desinfektera med t ex Klorhexidin eller handdesinfektion.



## 2. Provta

**Person utsatt för blod = exponerad**  
(HBsAg, anti-HCV och HIV)

**Person som blodet kommer ifrån om denne är känd = smittkälla**

(HBsAg, anti-HCV och HIV. Vid känd hepatit C ta även HCV-RNA)

Använd [pappersremiss!](#)\*



## 3. Vaccinera

Ge en dos vaccin mot hepatit B snarast och senast 48 timmar efter incidenten till personen utsatt för blod.

**Följ upp** med ytterligare doser, se [Terapirekommendationer Halland](#).

**Vid känd blodsmitta hos smittkälla – ring Infektionsjouren!**

Se rutin, länkar och mer info på [Vårdgivarwebben](#)



**\*Anges i remissen:**

Kliniska data = "stickskada smittkälla/exponerad", när och var incidenten skett samt kontaktuppgifter.

Remitterande inrättning = företagshälsovården om sådan finns och incidenten skett under arbetstid, annars provtagande enhet.